



## Vacunas escolares requeridas y recomendadas - INDIANA 2018–19

Para obtener más información sobre las vacunas, visite [vaccinateindiana.org](http://vaccinateindiana.org)

3 a 5 años de edad	Kínder a 4to. grado	5to. grado	6to. grado	7mo. a 11vo. grado	12vo. grado
Hepatitis B (HepB) 3					
Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP/DT) 4	DTaP/DT 5		Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap) 1		
Polio inactivada (IPV) 3			IPV 4		
Sarampión, paperas y rubéola (MMR) 1			MMR 2		
Varicela 1	Varicela 2				
	Hepatitis A (HepA) 2	HepA 2*	HepA 2	HepA 2*	HepA 2
			MCV4 (antimeningocócica) 1		MCV4 2
			HPV (Virus del papiloma humano) 2*	HPV 2*/3*	
					MenB (antimeningocócica) 2*
Influenza anual*					

\* Vacunas recomendadas | El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

# INDIANA 2018–19

## Vacunas escolares requeridas y recomendadas



	REQUERIDA		RECOMENDADA
<b>3 a 5 años de edad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Hepatitis B</li> <li>• 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina)</li> <li>• 3 Polio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Varicela</li> <li>• 1 MMR (Sarampión, paperas y rubéola)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza anual</li> </ul>
<b>Kínder a 4to. grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Hepatitis B</li> <li>• 5 DTaP</li> <li>• 4 Polio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MMR</li> <li>• 2 Varicela</li> <li>• 2 Hepatitis A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza anual</li> </ul>
<b>5to. grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Hepatitis B</li> <li>• 5 DTaP</li> <li>• 4 Polio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MMR</li> <li>• 2 Varicela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza anual</li> <li>• 2 Hepatitis A</li> </ul>
<b>6to. grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Hepatitis B</li> <li>• 5 DTaP</li> <li>• 4 Polio</li> <li>• 2 MMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Varicela</li> <li>• 2 Hepatitis A</li> <li>• 1 MCV4 (antimeningocócica)</li> <li>• 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza anual</li> <li>• 2 HPV (Virus del papiloma humano)</li> </ul>
<b>7mo. a 11vo. grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Hepatitis B</li> <li>• 5 DTaP</li> <li>• 4 Polio</li> <li>• 2 MMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Varicela</li> <li>• 1 MCV4 (antimeningocócica)</li> <li>• 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza anual</li> <li>• 2 Hepatitis A</li> <li>• 2/3 HPV</li> </ul>
<b>12vo. grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Hepatitis B</li> <li>• 5 DTaP</li> <li>• 4 Polio</li> <li>• 2 MMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Varicela</li> <li>• 2 Hepatitis A</li> <li>• 2 MCV4</li> <li>• 1 Tdap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza anual</li> <li>• 2 MenB (antimeningocócica)</li> <li>• 2/3 HPV</li> </ul>

El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

**Hep B:** La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas.

**DTaP:** 4 dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4ta. dosis se aplicó el día en que el niño cumplió 4 años de edad o después.

**Polio:** \*3 dosis de polio son aceptables para todos los grados si la tercera dosis se aplicó el día en que el niño cumplió 4 años de edad o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior, y si se usó sólo un tipo de vacuna (todas OPV [orales] o todas IPV [inactivas])

\*Para los alumnos en Kínder a 8vo. grado, la dosis final se debe aplicar el día en que el niño cumpla 4 años de edad o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

**Varicela:** La documentación médica sobre el historial de enfermedades, que incluya mes y año, es prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta el 10mo. grado. La información por parte de los padres sobre el historial de enfermedades es aceptable para 11vo. y 12vo. grados.

**Tdap:** No existe intervalo mínimo para la última dosis de Td.

**MCV4:** Las personas que reciben la primera dosis después de cumplir 16 años de edad sólo necesitan una dosis de MCV4.

**Hep A:** El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis de Hep A para Kínder a 4to. grado, 6to. y 12vo. grados.

\*Para los grados 5to., y 7mo. a 11vo., se recomiendan 2 dosis de vacuna contra Hep A.



Para obtener más información sobre las vacunas, visite [vaccinateindiana.org](http://vaccinateindiana.org)